



Aktueller Impfschutz Ihres Kindes in der Kindertagesstätte

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (STIKO) sollten Impfungen vollständig und zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.

Erziehungsberechtigte müssen bei Aufnahme ihres Kindes in die Kita laut Präventionsgesetz einen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorlegen.

Darüber hinaus ist nach dem Masernschutzgesetz ein ausreichender Masern-Impfschutz nachzuweisen.

Ist Ihr Kind nicht altersentsprechend geimpft (siehe Tabelle), empfehlen wir Ihnen die fehlenden Impfungen **schnellstmöglich nachzuholen**. Bitte beachten Sie, dass die Impfung gegen Meningokokken B bis zu einem Alter von 5 Jahren empfohlen wird, gegen RSV bis zu einem Alter von 12 Monaten und gegen Rotaviren bis zu einem Alter von 4 Monaten.

Impfung	Anzahl	im Alter von
Rotaviren	2 - 3*	6 Wochen - 4 Monaten
Tetanus (Wundstarrkrampf) ^a	3	2 - 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 - 6 Jahren)
Diphtherie ^a	3	2 - 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 - 6 Jahren)
Pertussis (Keuchhusten) ^a	3	2 - 11 Monaten (4. Impfung im Alter von 5 - 6 Jahren)
Poliomyelitis (Kinderlähmung) ^a	3	2 - 11 Monaten
Hämophilus influenzae Typ b (Hib) ^a	3	2 - 11 Monaten
Hepatitis B ^a	3	2 - 11 Monaten
Pneumokokken ^a	3	2 - 11 Monaten
Masern, Mumps, Röteln	2	11 - 15 Monaten
Windpocken (Varizellen)	2	11 - 15 Monaten
Meningokokken B	3	2 - 12 Monaten
FSME („Zecken“- Impfung)	3	≥ 3 Jahren
COVID-19 (nur bei Vorerkrankungen)	3	≥ 6 Monaten, jährliche Auf- frischimpfungen
Influenza	1	≥ 6 Monaten, jährliche Auf- frischimpfungen
RS-Virus (Prophylaxe)	1	0 - 7 Monaten

**Bitte kontrollieren
Sie das Impfbuch
Ihres Kindes oder
legen Sie es Ihrer
Kinderärztin/Ihrem
Kinderarzt vor!**

** je nach verwendetem Impfstoff im Abstand von mind. 4 Wochen*

^a Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen